© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

geringere Grösse, tiefere Nähte, weit mehr gewölbte Umgänge, mehr kugelig geformte Schlusswindung, weniger spitzen oberen Mündungswinkel, sowie durch das Abstossen der Innenlippe bei ausgewachsenen Stücken und durch eine glasige Schale kennzeichnen.

35. Cerithium reticulatum da Costa, etwa ein Dutzend Exemplare an Steinen.
36. Buccinum undatum L., noch nicht lebend gedrakt.
37. Nassa reticulata L., desgleichen.
38. Fusus (Neptunea) antiquus L., vier Exemplare; das grösste 75 Mm. lang.
39. Neritina fluviatilis var. baltica Nilss. Einzeln auf der Rhede, häufiger im Hafen.

D. Cephalopoda.

40. Loligo breviceps, Steenstr., früher im Archiv der Meckl. Freunde der Naturgesch. 26 p. 104 als L. vulgaris beschrieben, ein Männchen von 30 Ctm. Länge, im Brackwasser der Trave gefangen (auf Taf. 1 abgebildet).

Tausch-Catalog

des Tauschvereins

der deutschen malacozoologischen Gesellschaft.

N. B. Die Preise in Reichsmark per Stück.

Helix	ℳ		ℳ
appressa Say. Ver. St. v.N.-A.	0,40	stenotrema, Raf. V. S. v.N.-A.	0,30
clausa, „ „	0,30	Macrocyclis concava, Say. Ver. St. v. N.-Am.	0,30
coelata, Stud. Dinkelscherben	0,30	Verschiedene der im Catalog vom Decemb. angekündigten Helices etc., die rasch abgingen, sind unterwegs, und können jetzt wieder bestellt werden.	
fallax, Say. Ver. St. v. N.-A.	0,40		
inflecta, Say. „	0,20		
intertexta, Binn. „	0,20		
palliata, Say. „	0,40		
profunda, Say. „	0,20		
Rugeli, Shuttlew. „	0,20		

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	ℳ
Clausilia	
pumila, Ziegl. Regensburg	0,25
olympica, Friv. Olymp	0,30
asphaltina, Zgl. Kärnthen	0,20
Rolphii Leach. Mittel-Rhein	0,25
lineolata Held. „	0,20
dubia Drp. v. speciosa. Eifel	0,25
Vitrina	
diaphana, Drp. Dinkelscherb.	0,15
pellucida, Müll. „	0,10
elongata, Drp. „	0,15
Amnicola	
pallida, Hald. Ver. St. v. N.-A.	0,10
Anculosa	
carinata, Brug. V. St. v. N.-A.	0,20
costata, Anth. „	0,20
praerosa, Say. „	0,10
subglobosa, Say. „	0,20
Tryoni, Lewis. „	0,20
tintinabulum, Lea „	0,20
Paludina	
decisa, Say. V. St. v. N.-A.	0,25
ponderosa, Say. „	0,40
rufa, Hald. „	0,30
integra, Say. „	0,20
subcarinata, Say. „	0,20
subsolida, Hald. „	0,20
Melania	
alvearis, Conrad. V. S. v. N.-A.	0,20
aterina, Lea. „	0,10
canaliculata, Say. „	0,20
castanea, Say. „	0,10
Clarkii, Lea. „	0,20
depygis, Say. „	0,20
filum, Lea. „	0,20
gradata, Anth. V. St. v. N.-A.	0,20
lepida, Lea. „	0,20
livescens, Mke. „	0,20
Lyonii, Lea. „	0,20
morifera, Lea. „	0,20
parva, Lea. „	0,20
ponderosa, Anth. „	0,20
porrecta, Lea. „	0,20
robusta, Say. „	0,20
subularis, Lea. „	0,20
Troostii, Lea. „	0,20
unciale, Hald. „	0,20
verrucosa, Raf. „	0,20
virginica, Gmel. „	0,10
Ferner ca. 10 theils bestimmte Species von den Viti-, Samoa- & Cooks-Inseln . .	0,25
Physa	
gyrina, Say. Ver. St. v. N.-A.	0,20
„ v. Hildrethiana „	0,20
heterostropha, Say „	0,20
Valvata	
tricarinata Say. V. St. v. N.-A.	0,10
Planorbis	
bicarinatus Say. V. St. v. N.-A.	0,20
trivolvis, Say. „	0,20
fontanus, Lightf. Dklschrbn	0,10
Limnea	
reflexa, Say. V. St. v. N.-A.	—
Neritina	
danubialis, Ziegl. Donau	0,15
transversalis „ „	0,15
Somatogyrus subglobosus, Say Erie-Can.	0,20
Jo spinosa Lea. V. St. N.-A.	0,30

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Sphaerium	Mk.
partumeium, V. St. v. N.-A.	0,20
simile, Say. „	0,20
striatinum, Lam. „	0,20
transversum, Say. „	0,20
Pisidium	
amnicum. Müll. Dnklschrbu.	0,10
fossarinum, Cless. „	0,10
Henslowianum, Shep. „	0,10
„ v. pulchrum, Cless. „	0,10
pallidum, Jeffr. „	0,10
oder 4 Stück von diesen 5 Sp. zu 25 Pf.	

Trivia	Mk.
Childreni, Gray. Paumotu-I.	0,15
californica, „ California	0,15
Solandri, „ „	0,15
quadripunctata, Gray. Cuba	0,10
tremeza, Duclas. Kaui	0,15
insecta, Migh. „	0,10
Risella	
tantilla, Gld. Sandwich-I.	0,20
Cypraea	
irrorata, Sch. Paumotu	0,80
Sowerbyi, Kien. California	0,35
polita, Robts. Sandw.-I.	0,50

Von den englischen Land- und Süsswasser-Conchylien sind noch 2 Sammlungen von ca. 130 Species, nach Jeffreys bestimmt, mit sicheren Fundorten, 1 bis 5 St. per Species, à 50 Mk. netto zu haben. Desgleichen von englischen Meeres-Conchylien etwa 260 Species zu 100 Mk. netto baar. Obiges ist kaum der halbe Werth, der Eigenthümer wünscht im Ganzen zu räumen.

Schwanheim, bei Frankfurt a. M.

T. A. Verkrüzen.

Literatur-Bericht.

Materiaux pour servir à l'étude de la Faune profonde du Lac Leman. § XV. Mollusques par Mr. le Dr. A. Brot. Lausanne 1874.*)

Es werden aufgeführt: Cyclas cornea, eine einzelne Schale aus dem Genfer, ein lebendes Exemplar aus dem Bodensee, Pisid. amnicum, ein kleines Exemplar aus dem Bodensee, Pisid. lenticulare Normand — von Clessin bekanntlich später als neue Art beschrieben, Valvata obtusa, Limnaea stagnalis in einer zwerghaften Seeform und L. abyssicola n. sp.

Bericht über die Senckenbergische naturforschende Gesellschaft. 1874—1875.

p. 61. *Kobelt,* die geographische Vertheilung der Mollusken.

*) Verspätet zugegangen.